

โมคาชดทำทุเรียน

พินตัน-ทำใบ

สะสมอาหาร

เปิดตาดอก

ระยะมะเขือพวง



ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง
ห่างกัน 7-10 วัน

**โมคาแพลสัน
300ซีซี.**



ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง
ห่างกัน 7-10 วัน

**ไทโซ
300ซีซี.**



**โมคาแกรนด์
100ซีซี.**



**โมคาโบรอน
50ซีซี.**



**โมคาแคลเซียมโบรอน 300ซีซี.
โมคาแมกนีเซียม 300ซีซี.**



**เอ็มพาย
100ซีซี.**



โมคาโบรอน 100ซีซี.



โมคาแคลเซียมโบรอน 300ซีซี.



อีวาเฟรช 500กรัม



แวงเกอร์ เค 500กรัม



**แวงเกอร์ เค 500กรัม
นอยเออร์ เอ็กซ์ 300ซีซี.**



ไทโซ 300ซีซี.

พินตันทางดินใช้ มิวมิคบอล หรือ ดิมิเทอร์

ทางดินใช้ดิมิเทอร์



มิวมิคบอล
Humic acid + Amino.

**ช่วยในการพินตัน
ปรับปรุงโครงสร้างดิน
ล้างสาร**



โมคาแพลสัน

**อัตราใช้ 300ซีซี.
พินตันไตรมาส
กระตุ้นการเกิดรากใหม่
กระตุ้นการแตกยอดใหม่**



ดิมิเทอร์
ละลายน้ำใช้
อายุ 1-3 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุตั้งแต่
**สามารถ
ใช้ในช่วง
ระยะก่อ

เรียนคุณภาพ

ระยะหางแย้ใหม่

ระยะขยายผล

(อายุ30วัน)

ระยะสร้างเนื้อ

(อายุ60วัน)

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

(อายุก่อนเก็บเกี่ยว1เดือน)



โมคาแคลเซียมโบรอน 200ซีซี.

นอยเออร์ เอ็กซ์ 300ซีซี.

ไทโซ 300ซีซี.

โมคาแคลเซียมโบรอน 300ซีซี.

ไเอ็มพาย 100 ซีซี.

**โมคาแคลเซียมโบรอน 300ซีซี.
โมคาแมกนีเซียม 200ซีซี.**

**นอยเออร์ เอ็กซ์ 300ซีซี.
โมคาแมกนีเซียม 200ซีซี.**

ไทโซ 300ซีซี.

แวงเกอร์ เค 500 กรัม

แวงเกอร์ เค 500 กรัม

แวงเกอร์ เค 500 กรัม

แวงเกอร์ เค 500 กรัม

แวงเกอร์ เค 150-200กรัมต่อต้น

ขยายผลสร้างเนื้อใช้ ไเอ็มพาย 100-200ซีซี.

โมคา
เคมีคอลส์

ออร์
Humic acid 70%
Fulvic acid15%
100%
ใช้ 20-30 กรัมต่อต้น
ใช้ 50-100 กรัมต่อต้น
7ปี ใช้ 150-200 กรัมต่อต้น
สมบรูณ์หรือละลายน้ำฉีดพ่นได้
ระยะพ่นต้นหลังเก็บเกี่ยว
จนออกดอก ระยะขยายผล

ไเอ็มพาย amino 19ชนิด
ลดอาการเครียด ร้อนจัด หนาวจัด ดอกไม่ออก
สร้างเนื้อ สะสมอาหาร
อากาศร้อนใช้ 50-100ซีซี.
อากาศเย็นกระตุ่น ใช้150-200ซีซี.

ทุกอัตราใช้ต่อน้ำ 200 ลิตร

โมคดา®
เคมีคอลส์

ทุเรียน

ผู้จัดทำน่าย : บริษัท โมคดา เคมีคอลส์ จำกัด
59/269 ซอยสะพานงา ถนนสวประชาธารนุร หมู่ 6 ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 02-150-2923 แฟกซ์. 02-150-2924

คุณภาพที่เกษตรกรไว้วางใจ

คู่มือดูแลรักษาโรคในสวนทุเรียน



ลันตัน

คอปเปอร์ซิลิเกต
(ไตรเบสิก)
200ซีซี.



โรคน้ำตาย ทุเรียน



ใบจุดสาหร่าย



ใบจุด



ลุ่มบ้า
400-500ซีซี.



โรคน้ำตาย ทุเรียน



มอลล่า 200ซีซี.
เมนคูน 300ซีซี.

หรือ

มอลล่า 200ซีซี.
ไดฟโนโคนาโซล+โพรฟิโคนาโซล 300ซีซี.



โรคใบไหม้ (แอนแทรคโนส)



โรคราสีชมพู



พืชร้าย



เมนคูน 300ซีซี.



ราแป้งใน ทุเรียน



ราดำใน ทุเรียน



มอลล่า 200ซีซี.
+
ไดเมโทมอร์ฟ 50WG
400-500กรัม



ไฟทอปธอร่า สดุด



ฟอสเฟม หรือฉีด
ฟอสเฟม 40 SL

ฉีดฟ่น 400-500ซีซี.
ฟอสเฟม ผสมสารฟอสเฟม 40SL
กับน้ำกลั่น ในอัตราส่วน 1:1



ฟอสฟีน 400-500กรัม

หรือ

โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์
+เมทาแลกซิล 25WP
400-500กรัม



ไฟทอปธอร่า โคนเน

คู่มือจัดการไรและแมลงในส่วนทุเรียน



โรคา
200ซีซี.



หรือ

นีโอ
200ซีซี.



หรือ

สเปียร์ส
150-200ซีซี.



เพลี้ยไก่แจ้



เพลี้ยจักจั่นฝอย

โมคา ไพมีโทรซิน
200กรัม
+
เมทรินา
200ซีซี.



หรือ



มาซาร์
50-100กรัม
+
ไซเฟอร์เมทริน
+ โพรพิโนฟอส
300ซีซี.



เพลี้ยหอย



เพลี้ยหอย



เพลี้ยแป้ง

อาเธอร์
300ซีซี.
+
เมทรินา
300ซีซี.




หรือ



ไทอะมีโทกแซม
200กรัม
+
เมทรินา
300ซีซี.



เพลี้ยไฟ



มาซาร์ 100กรัม
+
ไซเฟอร์เมทริน
+ โพรพิโนฟอส
300ซีซี.



มาซาร์ 100กรัม
+
อิมิดาโคลพริด 70 100กรัม



หนอนเจาะ



สเตตัส
300ซีซี.

หรือ



มาซาร์ 100กรัม
+
อิมามะกัตินเบนโซเอต 300กรัม

หรือ



มาซาร์ 100กรัม
+
ไซเฟอร์เมทริน
+ โพรพิโนฟอส
300ซีซี.

ปรับปรุงคุณภาพน้ำและเพิ่มคุณภาพสารเคมี



มิกซ์ซ่า 50-100ซีซี.
จับติดใบไต้ติขึ้น
ช่วยในการแผ่กระจาย
ทนการชะล้างของฝน
หรือ



สปีดไฟร์ 20-50ซีซี.
สารเสริมฤทธิ์ทำให้สารเคมีดูดซึมได้ดี
และทั่วถึงทุกจุดซ่อนเร้น
ช่วยในการแผ่กระจาย
ปลอดภัยไวภายใน 5 นาที



มอคามิคซ์ 20-50ซีซี.
ช่วยปรับสภาพน้ำก่อนการผสมสารต่างๆ
เพื่อป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของสาร
เพิ่มความสามารถในการละลายของสาร
ที่ละลายน้ำได้ยาก ให้ละลายน้ำได้ดีขึ้น

ทุกอัตราใช้น้ำ 200 ลิตร